

برنامه غذایی برنج با محصولات آریا شیمی

نام کود	زمان مصرف	خزانه	بعد از انتقال نشا به زمین اصلی	پنجه زنی	ساقه دهی	دانه بندی و خمیری شدن
آلگورا (کود کامل همراه با مواد محرک رشد طبیعی)	آبکود، ۳-۴ کیلوگرم در هکتار		محلول پاشی، ۱/۵-۲ کیلوگرم در هکتار			
هاسمیک (هیومیک اسید غنی شده با اسید فولویک و عناصر ضروری)			آبکود، ۳-۴ کیلوگرم در هکتار		محلول پاشی، ۱/۵ کیلوگرم در هکتار	
ویکر میکس (مجموعه عناصر میکرو با اسیدهای آمینه)				محلول پاشی، ۱ کیلوگرم در هکتار	محلول پاشی، ۱ کیلوگرم در هکتار	
بوستانو/سولفات پتاسیم آریا (کود پتاس بالا همراه با عناصر ریز مغذی/ سولفات پتاسیم)			آبکود، ۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار			آبکود، ۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار
کودهای NPK آریا/تاباک (کودهای کامل همراه با عناصر میکرو)		۱۰-۵۲-۱۰ آریا - آبکود، ۱۰ - ۱۵ کیلوگرم در هکتار	تاباک ۱۹-۱۹-۱۹ محلول پاشی، ۳ - ۲ کیلوگرم در هکتار	۲۰-۲۰-۲۰ آریا - آبکود، ۱۰ - ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۱۵-۵-۳۰ آریا - آبکود، ۱۰ - ۱۵ کیلوگرم در هکتار	
ویکر روی (روی غنی شده با اسید آمینه)				محلول پاشی، ۱-۱/۵ کیلوگرم در هکتار		
سیتام پودری (کود سیلیسیم پودری)	آبکود، ۲-۴ کیلوگرم در هکتار		آبکود، ۲-۴ کیلوگرم در هکتار		آبکود، ۲-۴ کیلوگرم در هکتار	
آرامیکس (عناصر ریزمغذی به همراه منیزیم و گوگرد)				آبکود، ۵-۸ کیلوگرم در هکتار		آبکود، ۵-۸ کیلوگرم در هکتار

موارد مشخص شده با رنگ قرمز در اولویت بالاتری نسبت به موارد مشخص شده با رنگ زرد هستند، ولی مسلماً استفاده کامل از تمام برنامه نتایج بهتری در بر خواهد داشت.



توجه:

- ۱- برنامه غذایی ارائه شده به صورت کلی بوده و توصیه می گردد در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، با کارشناسان شرکت آریا شیمی تماس حاصل فرمایید.
- ۲- مقادیر ذکر شده برای یک برنامه جامع تغذیه برنج و برای برداشت حداکثر محصول در نظر گرفته شده است، اما در صورتی که حتی یک یا قسمتی از این برنامه اجرا شود، یقیناً اثرات مطلوب نسبی را در بر خواهد داشت.
- ۳- زمان های در نظر گرفته شده در جدول از نظر جذب عناصر بهترین زمان است، اما در صورتی که بعد از زمان های ذکر شده نیز محلول پاشی صورت گیرد می تواند مفید و موثر باشد. در صورت نیاز گیاه، محلول پاشی با فواصل ۱۰ تا ۱۴ روز تکرار شود.
- ۴- محلول پاشی باید در هوای آرام انجام پذیرد. بهترین زمان محلول پاشی صبح زود یا بعد از ظهر است که رطوبت هوا به بالاترین میزان ممکن رسیده و از شدت نور خورشید نیز کاسته شده باشد.
- ۵- جهت جلوگیری از گیاه سوزی، از محلول پاشی در هنگام ظهر و هوای گرم اجتناب شود.
- ۶- کودهای سری ویکر با یکدیگر قابل اختلاط می باشند، با این وجود انجام تست اختلاط پذیری قبل از مصرف در سطح وسیع ضروری است.
- ۷- استفاده از کودهای تک عنصری در صورت وجود علائم کمبود عناصر آهن، روی و منگنز جهت رفع علائم کمبود این عناصر غذایی توصیه می شود.
- ۸- در صورت نیاز به استفاده بیش از یک بسته ویکر میکس دقت شود مقدار اضافی ویکر پلاس مربوط به سایر بسته ها را به محلول اضافه ننمایید. مقادیر اضافه ویکر پلاس می تواند برای سایر محلول پاشی ها مورد استفاده قرار گیرد.



ARIASHIMI

دفتر مرکزی: تهران، پونک، بلوار عدل شمالی، نبش فجر سوم، پلاک ۱/۱

تلفن: ۰۲۱-۴۴۴۷۱۰۴۸ فکس: ۰۲۱-۴۴۴۷۲۷۸۱

www.ariashimi.ir