

بیماری های گیاهی قابل کنترل توسط بردو آریاشیمی

نام محصول	نام بیماری	میزان مصرف
درختان میوه	شانکر باکتریایی	محلول پاشی به نسبت ۱ درمصد، یک نوبت در مرحله تورم جوانه ها و یک نوبت موقع ریزش برگ ها
	شانکر سیتوسپورایی	محلول پاشی به نسبت ۲ درمصد، یک نوبت سمپاشی در پاییز پس از ریزش برگ ها و یک نوبت در اواخر بهار، تراشیدن شانکر و پانســـمان آن با مخلوط بردو ۸ درمصد صورت می گیرد.
	بیماری غربالی	محلول پاشی به نسبت ۲ درمصد، سم پاشی پاییزه بعد از ریزش برگ ها، سم پاشی زمستانه بعد از تورم جوانه ها و تکرار آن بعد از ریزش گلبرگ ها و در صورت لزوم، تکرار به فاصله ۱۴ روز
	پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه	در مناطق آلوده در فصل بهار، قبل از بارندگی طوقه درختان، ریشه های مجاور و تنه درخت تا ارتفاع ۷۰ سانتی متری با مخلوط بردو ۵ تا ۱۰ درمصد سمپاشی گردد. همچنین در درختان آلوده، در صورتی که وسعت محل آلوده کمتر از نصف دور تنه باشد می توان جهت معالجه پوست آلوده را همراه با کمی پوست سالم تراشید و سپس محل آن را با مخلوط بردو غلیظ ضدعفونی و با چسب باغبانی پوشاند.
	آتشک	محلول پاشی به نسبت یک درمصد طی ۴ نوبت، نوبت اول در مرحله تورم جوانه ها، نوبت دوم زمان باز شدن ۵ درمصد شکوفه ها، نوبت سوم زمان باز شدن ۵ درمصد شکوفه ها و نوبت چهارم زمان باز شدن کامل شکوفه ها
هلو	پیچیدگی برگ هلو	محلول پاشی با بردو ۱ درمصد یک نوبت در پائیز پس از ریزش ۵۰٪ برگ ها و دومی در اواخر زمستان قبل از تورم جوانه ها
مرکبات	گموز	در مناطق آلوده، در فصل بهار، قبل از بارندگی طوقه درختان، ریشه های مجاور و تنه درخت تا ارتفاع ۷۰ سانتی متری با مخلوط بردو ۵ تا ۱۰ درمصد سمپاشی گردد. همچنین در درختان آلوده، در صورتی که وسعت محل آلوده کمتر از نصف دور تنه باشد می توان جهت معالجه پوست آلوده را همراه با کمی پوست سالم تراشید و سپس محل آن را با مخلوط بردو غلیظ ضدعفونی و با چسب باغبانی پوشاند.
		در مناطق آلوده، در فصل بهار، قبل از بارندگی طوقه درختان، ریشه های مجاور و تنه درخت تا ارتفاع ۷۰ سانتی متری با مخلوط بردو ۵ تا ۱۰ درمصد سمپاشی گردد. همچنین در درختان آلوده، در صورتی که وسعت محل آلوده کمتر از نصف دور تنه باشد می توان جهت معالجه پوست آلوده را همراه با کمی پوست سالم تراشید و سپس محل آن را با مخلوط بردو غلیظ ضدعفونی و با چسب باغبانی پوشاند.
لیموترش	شانکر باکتریایی	در صورتی که آلودگی بیش از ۵ درمصد باشد، محلول پاشی به نسبت ۵/۰ درمصد، یک نوبت قبل از گلدهی
بادام	لکه آجری	محلول پاشی به نسبت یک درمصد، نوبت اول پس از ریزش گلبرگ ها و نوبت های بعدی به فاصله ۱۲ روز
گردو	آتزاکنوز	محلول پاشی به نسبت نیم تا یک درمصد، دو نوبت سم پاشی زمستانه بعد از ریزش برگ ها و دو نوبت سمپاشی بهاره بعد از ریزش گلبرگ ها

مخلوط بردو باید با نظر متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

مخلوط بردو به غیر از کشت های، ذک شده به بیماری ها، های، نامیده توصیه نمی شود.